

## Oljčna muha - POVZETEK

1. Oljčna muha se širi do 1 km zračne razdalje, za širitev zadostuje 1 okrasna oljka v posodi.
2. Nalet se začne zadnja leta že na začetku junija in lahko traja do konca novembra!
3. Leti samo podnevi, 90% naleta muhe prihaja iz tal pod oljkami!
4. Žerke lahko v zemlji mirujejo do nekaj let!
5. Višje so temperature, manj je možnosti za pojav žerk oljčne muhe (najbolj je aktivna med 16 in 30 stopinj C). Pozor, za aktivnost zadostuje poletna ploha in padec temperature, posledica razvoj žerk iz jajčec v roku 10 dni.
6. **Rumene lepljive plošče** - indikator naleta - Oljčna muha leti do 300 cm višine, najprej se razvije na južni strani oljke, zato plošče obesiti na spodnje zunanje meje na zavetrni oz. južni strani krošnje. Plošče nastaviti, ko zorijo namizne sorte oljk.
7. **Feromonske vabe** - indikator naleta - vabe obesiti na spodnje zunanje meje na zavetrni oz. južni strani krošnje. Vabe nastaviti, ko zorijo namizne sorte oljk. 1 do 3 vabe na hektar, odvisno od proizvajalca.
8. **Razkužitev tal in gnojenje - NEEM CAKE** - vsebuje hranila in snovi, ki delujejo kot insekticidi, brez karence, uniči žerke in nahrani drevo. 300g na 3 letno drevo, na 120o krožnice 50 cm od debla s sadilnim klinom naredimo 3 jamice, v vsako 100g Neem cake. Postopek ponovimo 2x letno, spomladi konec marca in jeseni takoj! po končanem obiranju.
9. **Razkužitev krošnje in gnojenje - NEEM TONIC** - vsebuje hranila in snovi, ki delujejo kot insekticidi, brez karence, uniči jajčeca, prepreči dostop muh na plodove in nahrani drevo. Preventivno škropljenje, - molj (sredi do konec aprila), muha (začetek junija, nadaljujemo ob prvem pojavu muh na rumenih prošnjah). 150 ml Neem tonic na 10 L mlačne vode, mešanico porabimo v 8 urah, pred škropljenjem naj vsaj 8 ur ne dežuje.

Postopek pri kurativi ponovimo 2x na 5 do 7 dni. Najbolj poškopimo spodnje zunanje veje in zalijemo! Meglica!

10. Preventivna uporaba Neem cake in Neem tonic, zmanjša prisotnost oljčne muhe na 3-5%.
11. **Razkužitev krošnje, hitrejša regeneracija in dvig rodnosti - KELP TONIC** - vsebuje ogromno kalija in kalijevih oksidov, aminokislin (zmanjšanje šokov zaradi suše, neviht, pozebe, napada škodljivcev) in več kot 70 mikrohranil. 20 ml Kelp tonic na 10 L mlačne vode, mešanico porabimo v 8 urah, pred škropljenjem naj vsaj 8 ur ne dežuje. Poškopimo celotno krošnjo in zalijemo!
12. **Pavje oko** - za res dober uspeh je potrebna preventiva. KELP TONIC + BIO ZEL - 20 ml Kelp tonic + 30 ml BIO ZEL na 10 L mlačne vode, mešanico porabimo v 8 urah, pred škropljenjem naj vsaj 8 ur ne dežuje. Poškopimo celotno krošnjo in zalijemo!
13. Preventivna uporaba Kelp tonica + Bio zela zmanjša pojav pavjega očesa za 75 do 95% (odvisno od sorte) in dvigne rodnost v treh letih od 15 do 300% (odvisno od sorte).
14. Namizne sorte oljk so bolj občutljive kot sorte za pridelavo olj (najbolj Istrska belica).